

兒科十~十八章 練習

陳品老師 整理

- D 1. 有關重型 β 型海洋性貧血 (β -thalassemia) 的敘述，下列何者錯誤？
(A) 是一種體染色體隱性遺傳疾病
(B) 母親於懷孕初期可做絨毛膜穿刺術確定診斷
(C) 出生後3~6個月才出現明顯的、嚴重的、進行性的溶血性貧血症狀
(D) 不需定期輸血，當血色素低於4 gm/dL時，才需輸血
- D 2. 陳小弟，10歲，罹患缺鐵性貧血，醫囑予注射鐵劑Imferon，有關注射方式的敘述，下列何者錯誤？
(A) 抽藥後需更換新針頭 (B) 注射時需採用Z字型肌肉注射
(C) 鐵劑注射後需略停5~10秒鐘，再拔出針頭
(D) 注射後需揉搓注射部位，以促進藥物吸收
- B 3. 有關血友病 (Hemophilia) 病童出血控制的護理措施，下列何者錯誤？
(A) 出血患處加壓固定不動 (B) 給藥盡量採IV不給口服
(C) 出血部位需抬高超過心臟高度 (D) 靜脈注射其所缺乏之凝血因子
- A 4. 下列那一種血液疾病會造成血管阻塞危機 (Vaso-occlusive crisis)、脾臟阻斷危機 (Splenic sequestration crisis)、再生不良危機 (Aplastic crisis)？
(A) 鎌狀細胞貧血 (Sickle cell anemia) (B) 再生不良性貧血 (Aplastic anemia)
(C) β 型-海洋性貧血 (β -Thalassemia) (D) 血友病 (Hemophilia)
- C 5. 有關再生不良性貧血 (Aplastic Anemia) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 不可以使用Aspirin退燒 (B) 仔細觀察皮膚、尿液、糞便有無出血現象
(C) 血小板有代償性增生情形 (D) 當白血球下降時，需採嚴密的保護隔離
- D 6. 下列何種致病原引起的腸胃炎常併有上呼吸道感染，屬自癒性疾病，但傳染力很高？
(A) 志賀氏桿菌 (B) 沙門氏桿菌 (C) 鏈球菌 (D) 輪狀病毒
- B 7. 9個月的彬彬體重11公斤，因急性腸胃炎腹瀉三天後體重減為8.9公斤，其情況屬於：
(A) 輕度脫水 (B) 中度脫水 (C) 嚴重脫水 (D) 正常體液喪失
- C 8. 化學治療分成三期，下列何者化學治療敘述錯誤？
(A) 第一期誘導期，主要功能是使不正常的WBC減少或消失，並使blast cell $<$ 5%
(B) 容易出血、感染、死亡的是誘導期
(C) 化學治療後的第四周CBC降到最低點，此時做才開始做BMT
(D) 恢復造血功能是在第三期維持期
- D 9. 6個月大的嬰兒患有胃食道逆流，對其父母的護理指導，下列何者正確？
(A) 暫停哺餵母乳 (B) 兩餐之間，多餵食果汁
(C) 進食後，嬰兒宜採左側臥 (D) 鼓勵及早餵食半流體軟質食物，如麥片糊
- A 10. 王小弟4個月大，持續腹瀉，下列護理措施何者較適當？
(A) 於臀部塗抹薄層之油劑 (如凡士林)，避免糞便直接刺激皮膚
(B) 每4小時使用烤燈，需距離臀部20公分，每次使用時間1小時
(C) 依照進食程度來調整牛奶濃度 (D) 每天以Aq-BI消毒清洗臀部後擦乾
- D 11. 有關蟯蟲感染的敘述，下列何者錯誤？
(A) 自體傳播方式：手到肛門處抓癢後進食 (B) 家庭傳播方式：吸入漂浮的蟲卵

- (C)蟲卵檢查方法：以膠帶黏拭肛門處 (D)收集蟲卵時間：在晚上上床睡覺前
- B 12. 咚咚，6歲，因經常性扁桃腺炎影響飲食、呼吸，於今日接受扁桃腺切除手術。有關術後的照顧，下列措施何者不適當？
- (A)未清醒前宜協助其採俯臥或側躺姿勢，以促進傷口分泌物引流
(B)清醒後若無嘔吐、出血，可試由口進食冰涼的布丁、檸檬汁等
(C)儘可能滿足孩子需求，避免其哭泣、用力咳嗽、清喉嚨等動作
(D)術後 24 小時內可運用靜脈注射方式給予止痛劑
- C 13. 細支氣管炎嬰幼兒使用氧氣頭罩 (O_2 hood) 時的護理措施，下列敘述何者不適當？
- (A)氧氣流量需大於5 L/min (B)可考慮與加熱型噴霧器一起使用
(C)所有氧氣治療管路及容器需每兩週更換一次 (D)潮濕瓶宜使用等張性的蒸餾水
- B 14. 有關外因性(過敏原)氣喘 Asthma 診斷性檢查敘述，下列何者正確？
- (A)IgG 免疫球蛋白值上升 (B)血液檢查時，嗜伊紅性白血球數種數增加
(C)聽診胸腔可以發現系小的吸氣末囉音 ralse
(D)使用茶鹼 Aminophylline 支氣管擴張劑，血清濃度要>ug/ml 才有治療效果。
- B 15. 肺計量(spirometry)可測得兒童之第一秒用力呼氣容積(force expiratory Volume, FEV₁)及用力肺活量(force vitalcapacity, FVC)其，FEV₁/FVC 的數值為多少，代表兒童肺功能呈現輕度阻塞情形？
- (A)大於 80% (B)60~79% (C)40~59% (D) <40%
- D 16. 李小妹，9 歲，作扁桃腺切除術，術後 2 小時，意識清醒，不斷有吞嚥動作，並表示喉嚨痛。下列何種措施錯誤？
- (A)請李小妹頭側向一邊，並檢查咽喉部傷口 (B)給李小妹局部冰敷或含少量冰塊
(C)評估疼痛強度，並依醫囑給予止痛劑 (D)使用抽痰設備，自口、鼻抽吸分泌物
- D 17. 陳小弟，4歲，診斷為哮吼症 (croup)，下列何種護理措施最合宜？
- (A)限制水分的攝取 (B)使用人工呼吸器協助呼吸
(C)床旁邊準備壓舌板，以利醫師檢查會厭 (D)高濕度的噴霧治療
- D 18. 小強，5歲，因急性氣喘發作而入院，醫囑Aminophylline靜脈注射，護理師在監測此藥物的中毒症狀時，不包括下列何者？
- (A)腸胃不適、噁心嘔吐 (B)心搏過速、心律不整
(C)頭痛、不安與失眠 (D)皮膚發熱、起丘疹
- A 19. 有關黴漿菌性肺炎 (mycoplasma pneumonia) 之敘述，下列何者不正確？
- (A)病程進展非常快速，聽診時患部出現濁音
(B)具有高度的傳染性，主要侵犯肺下葉及支氣管周圍
(C)易罹患的年齡層為學齡期青少年，會有輕微發燒症狀
(D)以紅黴素治療為主，預後差，易引起肋膜積水
- C 20. 林小弟，6歲，每日白天都有氣喘症狀，平時有慢性咳嗽或呼吸喘鳴聲，一星期內發作 2次，夜間症狀更明顯，發作時會影響活動及睡眠。依據以上敘述，林小弟屬於那一層級氣喘發作？
- (A)輕度間歇性氣喘 (B)輕度持續性氣喘 (C)中度持續性氣喘 (D)重度氣喘
- C 21. 腎病症候群(nephrotic syndrome)病童臨床表徵與檢查結果，不會有下列何種現象？
- (A)水腫 (B)蛋白尿 (C)尿素氮增加 (D)血脂增加

- A 22. 小明罹患慢性腎衰竭，因尿毒霜沈積導致皮膚搔癢，下列護理指導何者正確？
(A)以清水洗澡後塗擦乳液 (B)以消毒水洗澡 (C)以酒精拍拭 (D)以肥皂洗澡
- C 23. 有關急性腎絲球腎炎 (Acute glomerulonephritis) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)此病通常在A群β型溶血性鏈球菌感染後，1~3週急性發作
(B)會呈現血尿、蛋白尿及高血壓等症狀
(C)建議多喝柳丁汁、葡萄柚汁，可酸化尿液，補充鉀離子
(D)急性期必須臥床休息，直至無血尿且水腫消退為止
- A 24. 適合急性腎衰竭 (Acute renal failure) 病童的飲食，下列何者正確？
(A)高醣、高脂、低蛋白、低鉀、低鈉 (B)高醣、低脂、低蛋白、高鉀、低鈉
(C)低醣、低脂、高蛋白、高鉀、低鈉 (D)低醣、高脂、高蛋白、低鉀、低鈉
- B 25. 有關急性腎絲球性腎炎 (acute glomerulonephritis; AGN) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)主要由於上呼吸道或皮膚曾受到A群β型溶血性鏈球菌的感染
(B)病童在急性期時，會出現無尿或少尿情形，但不會有血尿
(C)急性期時會出現代謝性酸中毒 (D)鏈球菌抗體效價ASLO為陽性(+)
- B 26. 有關尿道下裂的醫療處置，下列敘述何者錯誤？
(A)重建手術後，男童能以站立姿勢小便，有利正向身體心像的建立
(B)最理想的手術時間是在3歲以後，因為此時兒童的小便控制能力較好
(C)術後可使用床上護架，以避免傷口部位受到被蓋、衣物等壓迫
(D)術後應鼓勵兒童努力喝水及補充流質食物，以利尿路通暢，減少感染
- C 27. 小丁，10歲，主訴頭痛並有嘔吐的現象，送醫後檢查發現為急性水腦症，目前接受腦室外引流 (external ventricular drainage) 手術，下列手術後護理何者不恰當？
(A)監測V/S及有無IICP之症狀 (B)觀察有無意識狀態改變、瞳孔放大之現象
(C)引流時，協助採頭部下垂姿勢，以利引流
(D)避免快速坐起，以免腦脊髓液迅速減少
- C 28. 有關細菌性腦膜炎 (bacterial meningitis) 病童的CSF檢查結果敘述，下列何者正確？
(A)外觀透明清澈 (B)多核白血球下降
(C)葡萄糖較正常者下降 (D)蛋白質較正常者減少
- A 29. 有關癲癇兒童的生酮飲食治療方式，下列何種成分在飲食中的比例需高達70%~80%？
(A)脂肪 (B)蛋白質 (C)醣類 (D)纖維質
- B 30. 有關腦性麻痺兒童可能發生的健康問題，下列敘述何者錯誤？
(A)肢體麻痺 (B)進行性神經病變 (C)手眼協調困難 (D)發音或構音困難
- B 31. 細菌性腦膜炎病童的腦脊髓液檢查，及反射徵象不會呈現下列何種結果？
(A)白血球數量 $550/mm^3$ (B)葡萄糖濃度100 mg/dL
(C)Brudzinski's sign(+) (D)腦脊髓液壓力 200 mmH₂O
- C 32. 協助吞嚥能力較差之腦性麻痺 (cerebral palsy) 兒童進食的措施，下列何者不適當？
(A)先熱敷兒童脛部，再予按摩，以放鬆僵硬的脛部
(B)以三指下顎控制法協助兒童閉嘴、咀嚼及吞嚥
(C)選擇質細、纖維低、口味重的飲食，以促進其食慾
(D)維持兒童頭部在正中位置，將食物置於舌頭後方，以利吞嚥
- D 33. 幼兒罹患先天性髖脫位，以布萊安特氏 (Bryant's) 牽引器牽引時，應採何種姿勢？

- (A)垂頭仰臥，患肢利用牽引器向下牽引 (B)側躺，患肢髖關節屈曲呈20度
(C)半坐臥，將患肢拉高45度以砂袋固定
(D)平躺、髖關節屈曲90度，雙腳向上牽引，臀部微離床面

- A 34. 手足徐動型 (athetoid type) 腦性麻痺的病童，其主要的護理重點是：
(A)給予容易吞嚥的食物 (B)增強下肢肌肉的收縮力量
(C)維持呼吸道通暢 (D)防止壓瘡的產生
- B 35. 下列何者是嬰兒期顱內壓升高的症狀？①頭圍異常增大 ②哭聲尖銳 ③前囟門凹陷
④血壓下降 ⑤落日眼 ⑥脈搏加快
(A) ①④⑥ (B) ①②⑤ (C) ②③⑤ (D) ③④⑥
- A 36. 4歲小宇，有癲癇的病史，且已服用Phenytoin (Dilantin) 3年，下列何者為長期服用此藥最重要的護理指導？
(A)做牙床按摩以減緩牙齦增生 (B)每日用試紙測尿蛋白，以監測腎功能
(C)避免跑步，以減少關節出血、疼痛 (D)宜採低鉀飲食，以減少心律不整的發生
- D 37. 有關葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症 (Glucose-6-phosphatase dehydrogenase) 兒童發生溶血性貧血時之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)臉色蒼白 (B)黃疸 (C)尿液呈深褐色 (D)皮膚起皮疹
- A 38. 有關兒童甲狀腺機能亢進 (Grave's disease) 的臨床表徵，下列何者正確？
(A)食慾增加，體重卻減輕 (B)腸蠕動慢，很容易便秘
(C)皮膚乾燥而皮厚、脫皮 (D)心跳速率快，體溫過低
- D 39. 有關糖尿病酮酸中毒之護理措施，下列何者不適合？
(A)觀察有無庫斯毛耳氏呼吸 (Kussmaul's respiration)，或低血鉀現象
(B)使用短效胰島素可很快控制血糖
(C)設立靜脈液體輸注管路，提供液體 (D)立即補充可迅速吸收的醣類飲食
- B 40. 甜甜患有第1型糖尿病，已接受胰島素治療，下列何種情形易引發酮酸中毒？
(A)未進食 (B)感染 (C)胰島素過量 (D)運動量增加
- D 41. 有關末期病童的疼痛控制，下列敘述何者正確？
(A)給予高劑量鴉片類藥物，會加速病童的死亡
(B)需嚴格監控止痛藥的劑量，避免超過上限而造成成癮
(C)使用鴉片類藥物時，需注意腹瀉等合併症的發生
(D)依循醫囑定時給予止痛藥，並視需要隨時加重劑量
- C 42. 有關癌症兒童在化學治療期間營養照顧之敘述，下列何者錯誤？
(A)在一天中食慾最佳的時刻，給予高熱量及高蛋白的食物
(B)在食慾不佳時，可採少量多餐，不強迫進食
(C)為預防便秘，每日需大量補充高纖維的蔬菜、水果
(D)口腔破皮時，給予溫度適中，不刺激的軟質食物，如布丁
- B 43. 有關白血病 (leukemia) 兒童潛在性感染的危險，下列敘述何者正確？
(A)血小板過多，容易血管阻塞 (B)未成熟的白血球無法抵抗感染
(C)紅血球的數目不足以攜帶氧氣 (D)凝血因子不足，無法止血
- B 44. 4歲小花最近遭遇母親死亡的經歷，根據此年齡對死亡的理解，小花可能會說什麼？
(A)「我的媽媽死了，爸爸會再幫我找個新媽媽。」

- (B)「我媽媽死了，但是我很快就可以再見到她。」
- (C)「我想我媽上天堂了，有一天我死了，我會去見她。」
- (D)「爸爸說天使帶媽媽上天堂了，為什麼天使只帶她去？」
- A 45. 有關兒童白血病的敘述，下列何者不正確？
- (A)急性骨髓性白血病(AML)占兒童白血病的80%
- (B)目前兒童白血病的治療以化學治療為主
- (C)較大兒童的骨髓穿刺，通常採後側腸骨嶺的部位
- (D)在化學治療的誘導期最容易出現感染及自發性出血
- B 46. 奇奇，11個月大，不慎被食物噎到而導致窒息，有關緊急處理的敘述，下列何者正確？
- (A)使奇奇俯臥跨於施救者手臂上，頭高於軀幹
- (B)施救者的手掌在奇奇背後肩胛骨間叩擊5下
- (C)讓奇奇仰臥，以手掌置於其上腹部向劍突方向施壓
- (D)雙手環繞奇奇的腰部，以拳頭在劍突下連續5次向上推擠
- D 47. 根據帕克蘭公式，前24小時輸液給予，下列何者正確？
- (A)前24小時每8小時都各給1/3的L/R
- (B)前8小時給1/2的L/R，後兩個8小時各給1/4、1/4的N/S
- (C)前16小時給1/2的L/R，後8小時給1/2的L/R
- (D)前8小時給1/2的L/R，後兩個8小時各給1/4、1/4的L/R
- C 48. 李小弟體重12公斤，不慎燙傷，評估為二度燒傷，燒傷面積為25%，醫囑24小時內緊急給予靜脈輸液，下列輸注何者正確？
- (A)最初12小時輸入總量的2/3為800 c. c.，第二個12小時輸入總量的1/3為400 c. c.
- (B)最初8小時輸入總量的1/3為400c. c.，第二及三個8小時各輸入總量的1/3為400c. c.
- (C)最初8小時輸入總量的1/2為600 c. c.，第二及第三個8小時，分別輸入300 c. c.
- (D)最初6小時輸入總量的1/2為600 c. c.，第二個6小時輸入150c. c.，餘200 c. c.在12小時內輸畢
- C 49. 有關新生兒心肺復甦術的敘述，下列何者錯誤？
- (A)按壓方式：以食指與中指同時垂直下壓1.25~2.5公分
- (B)按壓位置：兩乳頭連線下胸骨處
- (C)按壓速率：每分鐘120~140次 (D)按壓與呼吸之比為30：2
- A 50. 自閉症的兒童可能呈現的行為，不包括下列那一項？
- (A)雖然有語言障礙，但是感官能力與正常人一樣
- (B)有社交困難，如：不會與同年齡的互動
- (C)持續專注於物體的一部分，如：只瞪著眼看牆壁
- (D)固著於刻板而重覆的身體動作，如：不停的敲東西

~I will start fresh- be someone new.~

~我要重新開始—做一個不一樣的自己~