

103 年一月護理師【兒科】第一章~第三章考題

- 53 有關兒童慢性病的描述，下列何者正確？
- A. 慢性病的特徵是需要很長的時間才可治癒
 - B. 以正常化的概念，提供慢性病兒童以家庭為中心的護理
 - C. 慢性病是指 1 年內有超過 1 個月的時間受疾病症狀干擾日常生活
 - D. 慢性病的長期管理主要是依賴專業人員協助
-
- 42 有關兒童生理發展之敘述，下列何者錯誤？
- A. 新生兒時頭圍大於胸圍 2~3 公分
 - B. 前囟門在出生後 12~18 個月閉合
 - C. 滿週歲時體重是出生體重的 3 倍
 - C. 滿 4 歲時身高是出生身高的 4 倍
- 43 依據皮亞傑（Piaget）的認知發展理論，8 歲的小威對死亡的概念，下列何者正確？
- A. 沒有死亡的概念，但對失落有感覺、反應
 - B. 認為死亡就如同睡覺一樣，是暫時的分離
 - C. 認為死亡是不可逆轉的，每一個人都會死亡
 - D. 死亡擬人化，認為躲起來，就不會被死神抓到
- 44 信宏，出生時體重 3500 公克，身長 52 公分，目前剛滿 1 歲，根據最近評估所得之下列資料，何者顯示信宏的生長發育有問題？
- A. 身高 78 公分
 - B. 體重 8500 公克
 - C. 已長出上下中央及側門齒
 - D. 胸圍與頭圍皆為 48 公分
- 47 那一年齡層的兒童，容易誤解自己生病住院的原因，而出現罪惡及恐懼的感覺？
- A. 青少年期
 - B. 學齡期
 - C. 學齡前期
 - D. 幼兒期
- 48 護理師需要對下列那一位個案做進一步的評估？
- A. 1 歲的小英，只能獨自站立 2 秒鐘
 - B. 2 歲的大明，除有意義叫爸媽外，只會一個單字
 - C. 6 歲的小華，仍會吸吮大拇指，且偶爾尿床
 - D. 10 歲的小民告訴媽媽，如果爸媽再吵架，他就要離家出走

103 年一月護理師【兒科】第四章~第六章考題

- 58 罹患後天免疫缺乏症候群 (acquired immune deficiency syndrome) 的嬰兒最常見的死亡原因為何？
- A. 卡波西斯瘤 (Kaposi's sarcoma) B. 營養不良 (malnutrition)
C. 惡病質 (cachexia) D. 卡氏肺囊蟲肺炎 (pneumocystis carinii pneumonia)
- 59 有關卡介苗接種的敘述，下列何者正確？
- A. 此疫苗是由殺死的牛型結核桿菌製成
B. 新生兒不管體重多寡均需於出生 1 週內接種
C. 在左上臂三角肌的中央部位採皮下注射
D. 接種部位產生潰瘍時不可塗藥，讓其自然痊癒
-
- 49 收集兒童的尿液標本時，下列何者不適當？
- A. 無法合作的嬰幼兒，可使用小兒集尿袋留取尿液標本
B. 30 分鐘內需將尿液標本送至檢驗室
C. 使用小兒集尿袋時，每小時需檢查 1 次
D. 年齡較大且願意合作的兒童可採用留取中段尿的尿液標本
- 50 13 歲的阿文因白血病住院，下列護理措施何者最不適當？
- A. 進其房門時需先敲敲門 B. 阿文病情穩定時可鼓勵他打電話找同學聊天
C. 徵求阿文的同意，鼓勵同學來探訪 D. 為避免阿文擔心，病情解釋不宜過於詳細
- 51 娟娟，16 歲，罹患全身性紅斑狼瘡 (SLE)，此慢性疾病現階段對她造成最大的影響為：
- A. 不能上體育課及與同學參與體能活動、比賽而產生自卑
B. 身體外觀會因為藥物的副作用而改變，進而影響自我心像
C. 經常需要接受治療，擔心請假過多影響學業
D. 擔心會影響日後的生育能力
- 56 給予兒童眼藥或耳藥之敘述，下列何者錯誤？
- A. 眼藥水：滴入下眼瞼結膜之內側
B. 眼藥膏：由眼內角往眼外角擦抹於下眼瞼結膜上
C. 耳藥滴入：3 歲以下之兒童，將耳廓往上往後輕拉
D. 滴入耳藥時，協助兒童持續側躺約 10~15 分鐘
- 74 亮亮，2 歲半，體重 14 公斤，無法正常由口進食；為他插鼻胃管 (N-G tube) 時，下列敘述何者正確？
- A. 鼻胃管的尺寸應選擇 10~12 Fr.
B. 插管時，協助亮亮側躺向右側
C. 過程中若有咳嗽、噎到、發紺是正常的現象
D. 由鼻插入至胃的長度可由鼻尖經耳垂，連至肚臍來測量

103 年一月護理師【兒科】第七章~第十章考題

- 52 預防早產兒顱內壓升高造成顱內出血（intracranial hemorrhage）的護理措施，下列何者不適當？
- A. 疼痛治療後，安撫早產兒，減少其哭泣不安
 - B. 避免突然將早產兒頭轉向一側，而身體姿勢未隨之轉動
 - C. 隨早產兒的需求調整給氧濃度，維持其體內適當的氧氣濃度
 - D. 靜脈輸入低張溶液，補充體液時，需快速輸注
- 57 有關新生兒胎便吸入症候群之敘述，下列何者錯誤？
- A. 外觀皮膚、指甲、臍帶有胎便染色呈黃綠色
 - B. 絕大多數發生在足月兒或過期產者
 - C. 出生時即有呼吸急促、呼吸困難徵象
 - D. 在胎頭與肩部娩出後，立刻給予氧氣袋加壓協助呼吸
-
- 63 周小妹，2 個月大，罹患先天性心臟病，有關教導媽媽居家照護注意事項，下列何者錯誤？
- A. 母乳需擠出，再給予周小妹餵食或灌食
 - B. 宜選擇柔軟洞口稍大的奶嘴
 - C. 每次餵食時間宜超過 30 分鐘
 - D. 宜少量多餐，給予高熱量飲食
- 64 安安，5 個月大，出生正常且定期於健康服務中心完成嬰幼兒預防接種。現因川崎氏症（Kawasaki disease）第一次住院接受症狀處理及靜脈注射免疫球蛋白治療，下列的護理措施何者錯誤？
- A. 少量多餐方式補充流質或軟質食物，並監測輸出入量，以注意是否脫水現象
 - B. 急性期給予 aspirin 100 mg/kg/day 以抑制發炎及血小板凝集而造成心臟血管損傷
 - C. 注意安安四肢末梢循環狀態及紅疹、水腫及脫皮，給予棉質透氣之衣物
 - D. 提醒母親帶安安完成常規的疫苗接種，以增強免疫能力
- 65 凱凱，10 歲，出生檢查即發現罹患法洛氏四重症畸形，護理評估時會發現下列何項症狀？
- A. 易產生紅血球過少的現象
 - B. 可能出現杵狀指（clubbing finger）
 - C. 可能合併有肺發育不全
 - D. 肺動脈的壓力可能會較低
-
- 66 有關鐮刀狀細胞貧血（sickle cell anemia）的處置，下列何者正確？
- A. 可使用 aspirin 止痛
 - B. 以冷敷方式消除肢體腫脹
 - C. 以濃縮紅血球作輸血治療
 - D. 限制水分的攝取，以控制水腫
- 67 林小妹，9 個月，母親發現其體重沒有增加的現象，到醫院抽血檢查林小妹血紅素為 8 gm/dL，血比容為 30%，血清鐵質為 28 µg/dL，診斷為缺鐵性貧血，下列敘述何者正確？
- A. 缺鐵性貧血屬於體染色體隱性遺傳疾病
 - B. 鐵劑最好在飯前 1 小時與含維生素 C 之果汁一起服用
 - C. 停止餵母乳，改喝加鐵之配方奶
 - D. 肌肉注射鐵劑後須揉搓注射部位以助吸收

103 年一月護理師【兒科】第十一章~第十三章考題

75 小琪罹患粥樣瀉 (celiac disease)，護理師應指導母親避免給予小琪下列那種食物？

- A. 米飯 B. 麵包 C. 豆漿 D. 玉米
-

60 有關嬰幼兒急性中耳炎的原因，下列何者錯誤？

- A. 上呼吸道感染 B. 歐氏管較成人短、窄且彎曲
C. 腭裂尚未矯正 D. 耳內淋巴組織腫大，阻塞歐氏管

61 早產兒接受持續性給氧治療，氧氣需經潮濕瓶濕化，下列護理師的回答，何者最恰當？

- A. 潮濕的氧氣可以促進血液循環 B. 濕氣可以促進早產兒的肺擴張
C. 氧氣必須潮濕，以避免呼吸道黏膜太乾燥 D. 濕氣可以預防病毒性或細菌性肺炎

62 有關黴漿菌性肺炎 (mycoplasma pneumonia) 之敘述，下列何者錯誤？

- A. 大多侵犯 1~4 歲幼兒，較不容易傳染給其他家人
B. 會出現乾咳、無痰或少量痰，痰中血球種類為單核白血球
C. 胸部 X 光片會看到下肺葉處有斑塊狀的間質性肺炎的陰影
D. 給予紅黴素治療 10~14 天，或 azithromycin 治療 3 天
-

70 急性腎衰竭 (acute renal failure) 兒童出現下列那一個徵象時，需懷疑是血鉀過高？

- A. 頭痛 B. 心悸 C. 無尿 D. 便秘

73 徐小弟，6 歲，主訴頭痛及視力模糊，於急診室測量血壓為 150/100 mmHg，入院診斷為急性腎絲球腎炎 (AGN)，下列護理處置何者正確？

- A. 急性期必須臥床休息或於床上活動 B. 鼓勵攝取高鉀食物並限制飲水
C. 觀察病童是否因高血容積而造成肺水腫 D. 評估病童的膽固醇及三酸甘油脂是否上升

103 年一月護理師【兒科】第十四章~第十五章考題

- 76 小蘭，6 個月大，此次住院是因水腦症而置入右側的腦室腹膜分流管（ventriculoperitoneal shunt, V-P shunt），今日病況穩定準備出院，護理師給予父母出院護理指導，下列敘述何項不適當？
- A. 觀察小蘭的傷口周圍是否有紅腫現象
 - B. 觀察小蘭的前凶門是否膨出
 - C. 每日由同一人測量小蘭的頭圍
 - D. 教導父母協助小蘭採右側臥，以利引流
- 77 兒童罹患細菌性腦膜炎，下列何者為布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign）的陽性反應？
- A. 平躺時用手托高頭部，將其頸部迅速屈曲，病童會感到疼痛，膝部因而屈曲
 - B. 平躺時，雙手將大腿托高，再快速伸展小腿，檢查者感到阻力，病童感到疼痛
 - C. 用手指沿著病童腳跟由外側往上向內劃線，會出現大拇指向上翹，其餘四趾張開成扇形
 - D. 將病童的頭部從一邊轉至另一邊，眼球活動能成對比共軛朝向與頭部旋轉相反方向移動
- 78 有關罹患腦性麻痺的兒童及其家庭之護理指導，下列敘述何者錯誤？
- A. 為預防下肢攣縮，可以雙手控制膝關節，將雙腿內轉合併
 - B. 教導三指下顎控制法，協助病童閉嘴咀嚼及吞嚥
 - C. 鼓勵病童獨立完成自我照顧工作，並適時給予肯定
 - D. 鼓勵病童就學與其他兒童互動，積極擴展社交聯繫
- 79 有關罹患成骨不全（osteogenesis imperfecta）兒童的醫療及護理指導，下列敘述何者錯誤？
- A. 通常以骨內固定物做骨髓內固定，以加強長骨
 - B. 以脊椎固定桿合併骨水泥矯正部分脊椎變形
 - C. 因骨骼脆弱易發生骨折，應儘量完全固定不動
 - D. 在活動限制下執行主動運動，防止肌肉萎縮
- 80 祥祥，18 個月大，護理師執行格拉斯哥氏意識狀態（Glasgow coma scale, GCS）評估的結果如下：給予疼痛刺激，祥祥眼睛張開，且有退縮反應，但呼叫祥祥，並無反應，祥祥的格拉斯哥氏意識狀態分數是多少分？
- A. 3
 - B. 5
 - C. 7
 - D. 9
-
- 69 有關第一型糖尿病病童使用採血針檢驗血糖的護理措施，下列敘述何者較不恰當？
- A. 採血前先將手指浸泡冰水數秒，以減少採血時的疼痛感
 - B. 宜在手指指腹側邊採血，因其富含血管且含較少的神經末梢
 - C. 採血後應稍加壓止血，但避免按摩該部位
 - D. 勿將手指置於桌面扎針，以免刺入手指過深
- 71 小鑫，7 個月，罹患苯酮尿症，有關飲食的護理指導，下列敘述何者錯誤？
- A. 飲食治療目的在預防腎臟功能病變
 - B. 餵食特殊的牛奶配方，如 Lofenalac 和 Phenyl-Free
 - C. 飲食控制時間愈長愈好，至少持續至學齡期
 - D. 應避免攝取含魚、肉、蛋、牛奶、堅果、豆類等副食品
- 72 甲狀腺機能亢進（hyperthyroidism）好發於下列何者？
- A. 青春期女性
 - B. 青春期男性
 - C. 學齡前期女童
 - D. 學齡前期男童

103 年一月護理師【兒科】第十六章~第十八章考題

- 54 面對剛經歷喪子之慟的父母親，下列何項護理措施最適當？
- A. 安慰父母親：「你應該很欣慰，你的孩子現在已經不會感到疼痛了。」
 - B. 接納父母親的情緒反應，靜靜的陪伴在父母親身邊
 - C. 提醒父母，趕快幫孩子進行接下來的儀式
 - D. 趕快離開現場，以避免尷尬
- 55 有關瀕死兒童之護理，下列敘述何者錯誤？
- A. 病童主述疼痛時，應給予非鴉片類止痛劑，以防呼吸抑制
 - B. 病童體力較差、顯得疲倦時，可安排安靜而不費力的活動
 - C. 在視覺上要提供明亮的環境，以增加病童的安全感
 - D. 與病童說話時，要清楚且語調適當，以減少病童的焦慮
- 69 有關第一型糖尿病病童使用採血針檢驗血糖的護理措施，下列敘述何者較不恰當？
- A. 採血前先將手指浸泡冰水數秒，以減少採血時的疼痛感
 - B. 宜在手指指腹側邊採血，因其富含血管且含較少的神經末梢
 - C. 採血後應稍加壓止血，但避免按摩該部位
 - D. 勿將手指置於桌面扎針，以免刺入手指過深
-
- 41 依據 101 年 8 月 8 日修正的兒童及少年福利與權益保障法，當護理師知悉兒童施用毒品時，應於幾小時內向主管機關通報？
- A. 24 B. 48 C. 72 D. 96
- 45 執行 1 歲以下嬰兒急救時，應從那個部位檢查脈搏較合適？
- A. 膝膕動脈 B. 足背動脈 C. 橈動脈 D. 肱動脈
- 46 小波，11 個月大，吞食果泥時不慎噎到，呈現呼吸困難臉色發黑現象，下列護理措施何者正確？
- A. 立即替小波捏鼻，並給予口對口吹二口氣
 - B. 以哈姆立克法在其橫膈膜下之腹部，推擠 5 次
 - C. 將小波抱起放在床上，以食指及中指壓胸骨 5 次
 - D. 讓小波頭低於軀幹，用力在背後肩胛骨間拍擊 5 下及以兩手指壓胸 5 次

題號	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	A	D	D	B	D	D	C	B	C	D	B	D	B	B	A	C	D	D	D	B

題號	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	C	A	C	D	B	C	B	B	A	B	A	A	A	B	B	D	A	A	C	C